

**Processo nº 116/2022****Pregão Presencial nº 049/2022**

Objeto: Aquisição eventual e futura de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Adjudicação

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO Tendo em vista que a proposta da empresa G A MEDICAL LTDA E DISTRIMAR LTDA foi declarada vencedora, bem como por não ter havido recurso da habilitação da referida empresa e da classificação de sua proposta, o objeto licitado foi ADJUDICADO em seu favor.

Fornecedor: DISTRIMAR LTDA

Total lotes de itens e serviços R\$ 236.400,00

Lote 10 - LUVA LATEX PP

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
10	LUVA LATEX PP	CX	4.500,0000	39,4000	177.300,00	-
Total Lote: R\$ 177.300,00						

Lote 11 - LUVA LATEX PP ME/EPP

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
11	LUVA LATEX PP ME/EPP	CX	1.500,0000	39,4000	59.100,00	-
Total Lote: R\$ 59.100,00						

Fornecedor: G A MEDICAL LTDA

Total lotes de itens e serviços R\$ 83.284,50

Lote 1 - -Anestésico Cloridrato de Prilocaina 3%

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
1	<p>-Anestésico Cloridrato de Prilocaina 3% Prilonest 3% estão indicados para a anestesia de infiltração e bloqueio nervoso regional em odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada.</p> <p>Como para todos os AL, a dose varia e depende da região a ser anestesiada, da vascularização dos tecidos, da tolerância individual e da técnica de anestesia. Deve ser administrada a menor dose necessária para produzir anestesia eficaz. A dose máxima é de 4,5 mg/Kg sem ultrapassar 400 mg (equivalente a 7 carpules para adultos saudáveis normais); a dose deve ser reduzida em pacientes clinicamente comprometidos, debilitados ou idosos. MALAMED, SF. Manual de Anestesia Local. 5a. Ed. Elsevier, 2005.</p> <p>Doses máxima em carpules para pacientes saudáveis (4,5 mg de cloridrato de prilocaina / Kg - cada carpule de 1,8 ml contém 54 mg de cloridrato de prilocaina).</p> <p>Registro ANVISA</p> <p>Solução estéril injetável de Cloridrato de Prilocaina (30mg/ml) em associação com Felipressina (0,03UI/ml). Via de administração: Para uso exclusivo via injeção em mucosa ou tecidos moles.</p> <p>Cada mL da solução injetável contém:</p> <p>Cloridrato de Prilocaina.....30 mg</p> <p>Felipressina..... 0,03 U.I.</p> <p>Excipientes q.s.p..... 1,0 mL</p> <p>Excipientes: Metilparabeno, Cloreto de Sódio e Águapara Injeção</p>	UN	750,0000	5,8000	4.350,00	-
Total Lote: R\$ 4.350,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2022

Página(s): 2/6

Lote 2 - -Anestésico Cloridrato de Prilocaína 3% ME/EPP						
Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
2	<p>-Anestésico Cloridrato de Prilocaína 3% ME/EPP Prilonest 3% estão indicados para a anestesia de infiltração e bloqueio nervoso regional em odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada.</p> <p>Como para todos os AL, a dose varia e depende da região a ser anestesiada, da vascularização dos tecidos, da tolerância individual e da técnica de anestesia. Deve ser administrada a menor dose necessária para produzir anestesia eficaz. A dose máxima é de 4,5 mg/Kg sem ultrapassar 400 mg (equivalente a 7 carpules para adultos saudáveis normais); a dose deve ser reduzida em pacientes clinicamente comprometidos, debilitados ou idosos. MALAMED, SF. Manual de Anestesia Local. 5a. Ed. Elsevier, 2005.</p> <p>Doses máxima em carpules para pacientes saudáveis (4,5 mg de cloridrato de prilocaína / Kg - cada carpule de 1,8 ml contém 54 mg de cloridrato de prilocaína).</p> <p>Registro ANVISA</p> <p>Solução estéril injetável de Cloridrato de Prilocaína (30mg/ml) em associação com Felipressina (0,03UI/ml). Via de administração: Para uso exclusivo via injeção em mucosa ou tecidos moles.</p> <p>Cada mL da solução injetável contém:</p> <p>Cloridrato de Prilocaína.....30 mg Felipressina..... 0,03 U.I. Excipientes q.s.p..... 1,0 mL Excipientes: Metilparabeno, Cloreto de Sódio e Águapara Injeção</p>	UN	250,0000	5,8000	1.450,00	-
Total Lote: R\$ 1.450,00						

Lote 3 - -Anestésico Local Citocaína 3%						
Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
3	<p>-Anestésico Local Citocaína 3% Citocaína 3% são indicados para a anestesia de infiltração e bloqueio nervoso regional em Odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada.</p> <p>A dose máxima de Citocaína 3% são de 4,5 mg/kg de peso corpóreo sem ultrapassar 400 mg (equivalente a 7 carpule); a dose deve ser reduzida em pacientes clinicamente comprometidos, debilitados ou idosos. Recomenda-se que pacientes cardiopatas e com demais comprometimentos sistêmicos relatados anteriormente, recebam no máximo 5 carpule por consulta.</p> <p>Registro ANVISA</p> <p>COMPOSIÇÃO:</p> <p>Cada mL contém:</p> <p>cloridrato de prilocaína 30 mg felipressina 0,03 UI veículo estéril q.s.p. 1 mL (Veículo: cloreto de sódio, metilparabeno e água para injetáveis).</p> <p>A eficácia do cloridrato de prilocaína é equivalente à do cloridrato de lidocaína.</p> <p>Atualmente o cloridrato de lidocaína é o anestésico local mais utilizado em odontologia na maioria dos países.</p> <p>É usado como padrão de comparação para verificar a eficácia de todos os novos anestésicos locais.</p> <p>O índice de sucesso absoluto alcançado pela anestesia local dependerá da técnica realizada, das condições locais e do tecido anestesiado, observando-se que nas técnicas infiltrativa o sucesso é maior do que nas tronculares.</p> <p>Conservar à temperatura ambiente de 15 a 25 °C protegido da luz.</p> <p>O prazo de validade do Citocaína® 3% é de 24 meses.</p> <p>Embalagem plástico com 1,8ml cada. Cloridrato de Prilocaína com Felipressina 0,03UI / ml.</p>	UN	750,0000	6,7500	5.062,50	-
Total Lote: R\$ 5.062,50						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2022

Página(s): 3/6

Lote 4 - -Anestésico Local Citocaína 3% ME/EPP

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
4	<p>-Anestésico Local Citocaína 3% ME/EPP Citocaína 3% são indicados para a anestesia de infiltração e bloqueio nervoso regional em Odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada.</p> <p>A dose máxima de Citocaína 3% são de 4,5 mg/kg de peso corpóreo sem ultrapassar 400 mg (equivalente a 7 carpule); a dose deve ser reduzida em pacientes clinicamente comprometidos, debilitados ou idosos. Recomenda-se que pacientes cardiopatas e com demais comprometimentos sistêmicos relatados anteriormente, recebam no máximo 5 carpule por consulta.</p> <p>Registro ANVISA</p> <p>COMPOSIÇÃO:</p> <p>Cada mL contém:</p> <p>cloridrato de prilocaína 30 mg</p> <p>felipressina 0,03 UI</p> <p>veículo estéril q.s.p. 1 mL</p> <p>(Veículo: cloreto de sódio, metilparabeno e água para injetáveis).</p> <p>A eficácia do cloridrato de prilocaína é equivalente à do cloridrato de lidocaína.</p> <p>Atualmente o cloridrato de lidocaína é o anestésico local mais utilizado em odontologia na maioria dos países.</p> <p>É usado como padrão de comparação para verificar a eficácia de todos os novos anestésicos locais.</p> <p>O índice de sucesso absoluto alcançado pela anestesia local dependerá da técnica realizada, das condições locais e do tecido anestesiado, observando-se que nas técnicas infiltrativa o sucesso é maior do que nas tronculares.</p> <p>Conservar à temperatura ambiente de 15 a 25 °C protegido da luz.</p> <p>O prazo de validade do Citocaína® 3% é de 24 meses.</p> <p>Embalagem plástico com 1,8ml cada. Cloridrato de Prilocaína com Felipressina 0,03UI / ml.</p>	UN	250,0000	6,7500	1.687,50	-
Total Lote: R\$ 1.687,50						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2022

Página(s): 4/6

Lote 5 - Anestésico Local com Vaso Constritor Lidocaína 2% □ UN

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
5	<p>Anestésico Local com Vaso Constritor Lidocaína 2% Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral, extrações múltiplas, próteses imediatas e procedimentos endodônticos e procedimentos periodontais simples e complexos.</p> <p>Como ocorre com todos os anestésicos locais, a dosagem varia e depende da área a ser anestesiada, da vascularização dos tecidos, do número de segmentos nervosos a serem bloqueados, da tolerância individual e da técnica anestésica usada. Deve-se usar uma dose menor necessária e suficiente para proporcionar uma anestesia específica. A substância necessária deve ser fornecida em bases individuais. A dose máxima sugerida pelo Conselho de Terapêutica Odontológica da Associação Americana de Odontologia e pela Convenção da USP é de 4,4 mg / Kg, com ou sem vasoconstritor. Esta dose ainda permite o uso de um volume significativo da droga para se obter uma anestesia clínica profunda, com um risco um pouco menor de reações tóxicas (superdosagem). A dose máxima recomendada para as crianças com menos de 10 anos, com peso e desenvolvimento normal, deve ser fornecida de fórmula pediátrica padrão (ex.: Regra de Clark). A dose máxima recomendada de epinefrina é de 0,2 mg (ou o equivalente a 5,5 cápsulas de ALPHACAINE 50, 8,8 cápsulas de ALPHACAINE 80 ou 11 cápsulas de ALPHACAINE 100) para pacientes adultos saudáveis. Uma dose recomendada, recomendada para os associados à epinefrina, como pacientes ASA III ou ASA IV e pacientes clinicamente hipertireóideos, é de 0,04 mg por consulta (1 carpule de ALPHACAINE 50, 1 e ½ carpule de ALPHACAINE 80 ou 2 cápsulas de ALPHACAINE 100).</p> <p>* Na infiltração oral e / ou bloqueio mandibular, uma dose inicialmente usualmente efetiva é de 1 a 5 mL de lidocaína (½ a 2e ½ cartules). Em crianças menores de 10 anos necessários é necessário administrar mais que 0,9 a 1,0 mL (½ carpule) de lidocaína por procedimento, para alcançar anestesia local envolvendo um único dente. Durante a aplicação, recomenda-se fazer aspiração para evitar os riscos da injeção intravascular. Estabiliza a membrana neuronal inibindo o fluxo de íons necessários ao início e condução dos impulsos, causando por isto um efeito de anestesia local.</p> <p>Isento de Metilparabeno; Acondicionados em tubetes de cristal, que permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo; Minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizada; Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal.</p> <p>Tubete de vidro; Com vaso construtor; CARACTERÍSTICAS: Tubete de vidro. Construtor com vaso. Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1: 100.000.</p> <p>* Registro ANVISA Solução estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.Cada embalagem contém 50 tubetes. USO EXCLUSIVO POR INFILTRAÇÃO OU POR BLOQUEIO DE NERVO VIA SUBMUCOSA E INTRAGENGIVAL COMPOSIÇÃO: Cada mL da solução injetável de Alphacaine 1:100.000 contém: Cloridrato de Lidocaína 20,0 mg Epinefrina base 10,0 µg Excipientes q.s.p 1,0 mL Excipientes: Bissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção Embalagem cristal com 1,8ml cada. Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina 1:100.000 (Tubete de vidro)</p>	UN	1.125,0000	5,7500	6.468,75	-
Total Lote: R\$ 6.468,75						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2022

Página(s): 5/6

Lote 6 - Anestésico Local com Vaso Constritor Lidocaína 2% ME/EPP UN						
Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
6	<p>Anestésico Local com Vaso Constritor Lidocaína 2% ME/EPP Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral, extrações múltiplas, próteses imediatas e procedimentos endodônticos e procedimentos periodontais simples e complexos.</p> <p>Como ocorre com todos os anestésicos locais, a dosagem varia e depende da área a ser anestesiada, da vascularização dos tecidos, do número de segmentos nervosos a serem bloqueados, da tolerância individual e da técnica anestésica usada. Deve-se usar uma dose menor necessária e suficiente para proporcionar uma anestesia específica. A substância necessária deve ser fornecida em bases individuais. A dose máxima sugerida pelo Conselho de Terapêutica Odontológica da Associação Americana de Odontologia e pela Convenção da USP é de 4,4 mg / Kg, com ou sem vasoconstritor. Esta dose ainda permite o uso de um volume significativo da droga para se obter uma anestesia clínica profunda, com um risco um pouco menor de reações tóxicas (superdosagem). A dose máxima recomendada para as crianças com menos de 10 anos, com peso e desenvolvimento normal, deve ser fornecida de fórmula pediátrica padrão (ex.: Regra de Clark). A dose máxima recomendada de epinefrina é de 0,2 mg (ou o equivalente a 5,5 cápsulas de ALPHACAINE 50, 8,8 cápsulas de ALPHACAINE 80 ou 11 cápsulas de ALPHACAINE 100) para pacientes adultos saudáveis. Uma dose recomendada, recomendada para os associados à epinefrina, como pacientes ASA III ou ASA IV e pacientes clinicamente hipertireóideos, é de 0,04 mg por consulta (1 carpule de ALPHACAINE 50, 1 e ½ carpule de ALPHACAINE 80 ou 2 cápsulas de ALPHACAINE 100).</p> <p>* Na infiltração oral e / ou bloqueio mandibular, uma dose inicialmente usualmente efetiva é de 1 a 5 mL de lidocaína (½ a 2e ½ cartules). Em crianças menores de 10 anos necessários é necessário administrar mais que 0,9 a 1,0 mL (½ carpule) de lidocaína por procedimento, para alcançar anestesia local envolvendo um único dente. Durante a aplicação, recomenda-se fazer aspiração para evitar os riscos da injeção intravascular. Estabiliza a membrana neuronal inibindo o fluxo de íons necessários ao início e condução dos impulsos, causando por isto um efeito de anestesia local.</p> <p>Isento de Metilparabeno; Acondicionados em tubetes de cristal, que permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo; Minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizada; Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal.</p> <p>Tubete de vidro; Com vaso construtor; CARACTERÍSTICAS: Tubete de vidro. Construtor com vaso. Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1: 100.000.</p> <p>* Registro ANVISA Solução estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.Cada embalagem contém 50 tubetes. USO EXCLUSIVO POR INFILTRAÇÃO OU POR BLOQUEIO DE NERVO VIA SUBMUCOSA E INTRAGENGIVAL COMPOSIÇÃO: Cada mL da solução injetável de Alphacaine 1:100.000 contém: Cloridrato de Lidocaína 20,0 mg Epinefrina base 10,0 µg Excipientes q.s.p 1,0 mL Excipientes: Bissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção Embalagem cristal com 1,8ml cada. Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina 1:100.000 (Tubete de vidro)</p>	UN	375,0000	5,7500	2.156,25	-
Total Lote: R\$ 2.156,25						

Lote 7 - DETERGENTE ENZIMÁTICO						
Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
7	<p>DETERGENTE ENZIMÁTICO Embalagem com 1 litro; comprovadamente com ação bacteriostática; com 4 Enzimas; altamente eficaz contra a matéria orgânica; possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga; limpeza manual ou automatizada; Diluição de na proporção de 1 ml do produto para cada 1 litro de água, deixando agir por até 5 minutos; com registro na Anvisa; validade mínima de 2 anos.</p>	UN	150,0000	54,0500	8.107,50	-
Total Lote: R\$ 8.107,50						

Lote 8 - DETERGENTE ENZIMATICO ME/EPP						
Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
8	<p>DETERGENTE ENZIMATICO ME/EPP Embalagem com 1 litro; comprovadamente com ação bacteriostática; com 4 Enzimas; altamente eficaz contra a matéria orgânica; possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga; limpeza manual ou automatizada; Diluição de na proporção de 1 ml do produto para cada 1 litro de água, deixando agir por até 5 minutos; com registro na Anvisa; validade mínima de 2 anos.</p>	UN	50,0000	54,0500	2.702,50	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2022

Página(s): 6/6

Total Lote: R\$ 2.702,50**Lote 9 - Kit Suctor I para Bomba de Vácuo**

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
9	Kit Suctor I para Bomba de Vácuo Indicado para sucção de sangue e saliva. * 1 Suctor de Ø6mm (Saliva), sem filtro. * Pintura eletrostática de alta resistência. * Suctores reguladores de sucção. * Em alumínio anodizado com ponteiras cromadas removíveis e autoclaváveis. * Corpo liso isento de registros laterais. * Ponteiras cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. * Características Técnicas: * Peso Líquido: 1,105Kg. * Peso Bruto com Embalagem: 1,6Kg. * Comprimento mangueira do registro suctor saliva: 1,6m. * Comprimento mangueira corrugada: 3m	UN	5,0000	1.318,0000	6.590,00	-
Total Lote: R\$ 6.590,00						

Lote 12 - PINÇA CLÍNICA

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
12	PINÇA CLÍNICA AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PINÇA CLÍNICA PARA USO GERAL NO CONSULTÓRIO	UN	10,0000	25,0000	250,00	-
Total Lote: R\$ 250,00						

Lote 13 - ROLETE DE ALGODÃO

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
13	ROLETE DE ALGODÃO MACIO, ABSORVENTE, IDEAL PARA AFASTAMENTO DE BOCHECHAS E LÍNGUA. HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO	UN	5.250,0000	6,3200	33.180,00	-
Total Lote: R\$ 33.180,00						

Lote 14 - ROLETE DE ALGODÃO ME/EPP

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
14	ROLETE DE ALGODÃO ME/EPP MACIO, ABSORVENTE, IDEAL PARA AFASTAMENTO DE BOCHECHAS E LÍNGUA. HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO	UN	1.750,0000	6,3200	11.060,00	-
Total Lote: R\$ 11.060,00						

Lote 15 - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
15	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA Em conjunto com fio retrator, é indicado para promover o afastamento gengival. Frasco com 10ml.	UN	5,0000	43,9000	219,50	-
Total Lote: R\$ 219,50						

STª RITA DE JACUTINGA, 28 de Setembro de 2022.**EDUARDO BRENDAAW GOMES
PRESIDENTE DA C.P.L**